Chapitre 10

Calcul intégral

10.1 Introduction

f est une fonction continue, positive et croissante sur un intervalle $[a; b]$. On s'intéresse dans ce chapitre à l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan $\mathcal{D}$ délimitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

En divisant l'intervalle $[a; b]$ en n intervalles, on obtient l'encadrement : $s_n \leq \mathcal{A} \leq S_n$, où s_n est la somme des aires des rectangles situés sous $\mathcal{C}_f$ et S_n est la somme des aires des rectangles situés au-dessus de $\mathcal{C}_f$.

FIGURE 10.1 – Encadrement d'une aire par deux suites adjacentes

$$s_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \frac{b-a}{n} \quad ; \quad S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n}$$

On peut montrer que les suites (s_n) et (S_n) sont adjacentes (c'est-à-dire que (s_n) croît, (S_n) décroît et $\lim(S_n - s_n) = 0$) et que leur limite commune est $\mathcal{A}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, la largeur $\frac{b-a}{n}$ des rectangles devient infiniment petite et est notée dx . On note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

Le symbole $\int$ signifie encore « somme ». $f(x)dx$ peut être vu comme l'aire d'un rectangle de hauteur $f(x)$, de largeur dx .

Exemple en Python, pour $f(x) = 1 + x^2$, entre 1 et 4 :

```
def rectangle_inf(f,a,b,n):
    # donne une valeur approchée inférieure de l aire située
    # sous la courbe de f positive entre a et b
    # c'est l aire des n rectangles situés sous la courbe
    s = 0
    delta = (b-a)/n #largeur d un rectangle
    for k in range(n):
        s = s + delta * f(a+k*delta)
    return s

def rectangle_sup(f,a,b,n):
    # donne une valeur approchée supérieure de l aire située
    # sous la courbe de f positive entre a et b
    # c'est l aire des n rectangles situés au dessus de la courbe
    S = 0
    delta = (b-a)/n #largeur d un rectangle
    for k in range(n):
        S = S + delta * f(a+(k+1)*delta)
    return S

def p(x):
    return 1 + x**2

print(rectangle_inf(p,1,4,500))
print(rectangle_sup(p,1,4,500))
```

Affichage obtenu ;

23.955018000000006

24.045018000000001

10.2 Aire sous la courbe d'une fonction, intégrale

Si f est une fonction **continue et positive** sur $[a; b]$, l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ est l'aire du domaine colorié, mesurée en unités d'aires.

Aire entre deux courbes

Soit f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$, $a < b$. Si pour tout x de $[a; b]$ on a $f(x) \leq g(x)$, alors l'aire située entre les courbes de f et g sur $[a; b]$ est (en unité d'aires) :

$$\int_a^b (g(x) - f(x))dx$$

(quels que soient leurs signes)

Si f est une fonction continue sur un intervalle I , alors pour tous réels a et b dans I , on a :

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f sur I (c'est-à-dire : $F' = f$).

Exemple : f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$.

Calculons l'intégrale $J = \int_{-2}^1 f(x)dx$.

Une primitive de f est F définie par

$$F(x) = x^3 - x^2 + 3x$$

$$J = F(1) - F(-2) = -1 - (-22) = 21$$

10.3 Valeur moyenne d'une fonction

f est une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. On appelle valeur moyenne de f sur $[a; b]$ le nombre :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Exemples :

- la valeur moyenne sur $[0; 2]$ de $x \mapsto x$ est $\frac{1}{2-0} \int_0^2 x dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = 1$.
- Celle de $x \mapsto 2x + 1$ est $\frac{1}{2-0} \int_0^2 (2x + 1) dx = \frac{1}{2} (2^2 + 2 - (0^2 + 0)) = 3$
- Celle de $x \mapsto x^2$ est $\frac{1}{2-0} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{4}{3}$

Interprétation graphique (figure 10.2) : l'aire délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses, les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à l'aire du rectangle de longueur $b - a$ et de hauteur la valeur moyenne.

FIGURE 10.2 – Valeur moyenne d'une fonction positive

10.4 Primitives

10.4.1 Primitives des fonctions usuelles

On les détermine par la lecture inverse du tableau de dérivées.

Exemples :

- Une primitive de $x \mapsto 5$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto 5x + 3$.
- Une primitive de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \frac{x^3}{3}$.

- Une primitive de $x \mapsto x^3$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \frac{x^4}{4}$.
- Une primitive de $x \mapsto x + x^5$ est $x \mapsto \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^6$.

10.4.2 Primitives des fonctions moins usuelles (supplément)

On tente de reconnaître des dérivées connues : $nu'u^{n-1}$, $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $u'e^u \dots$

1. (gentil) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 6x(x^2 + 7)^2$$

est un polynôme, donc est continue (ce sera prouvé plus loin), donc admet des primitives sur $\mathbb{R}$. On reconnaît la forme $nu'u^{n-1}$:

$$f(x) = \underbrace{3}_n \times \underbrace{2x}_{u'(x)} \underbrace{(x^2 + 7)^2}_{(u(x))^{n-1}}$$

Une primitive de f est donc F :

$$F(x) = \underbrace{(x^2 + 7)^3}_{(u(x))^n}$$

2. (moins gentil) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + 2)(x^2 + 4x)^5$$

est un polynôme, donc est continue, donc admet des primitives sur $\mathbb{R}$. On reconnaît la forme $nu'u^{n-1}$ (si!) :

$$f(x) = \underbrace{6}_n \times \underbrace{(2x + 4)}_{u'(x)} \underbrace{(x^2 + 4x)^5}_{(u(x))^{n-1}} \times \frac{1}{12}$$

C'est bien la fonction de l'énoncé :

$$\frac{1}{12} \times 6(2x + 4) = \frac{1}{12} \times 6 \times 2(x + 2) = (x + 2)$$

Une primitive de f est donc F :

$$F(x) = \frac{1}{12} \underbrace{(x^2 + 4x)^6}_{(u(x))^n}$$

3. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x}{(3x^2 + 4)^3}$$

est un quotient de polynômes, donc est continue, donc admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît la forme $nu'u^{n-1}$ (...) :

$$f(x) = \underbrace{-2}_n \times \underbrace{(6x)}_{u'(x)} \underbrace{(3x^2 + 4)^{-3}}_{(u(x))^{n-1}} \times \frac{-1}{12}$$

NB : $n - 1 = -3$ donne $n = -2$.

Une primitive de f est donc F :

$$F(x) = -\frac{1}{12} \underbrace{(3x^2 + 4)^{-2}}_{(u(x))^n} = -\frac{1}{12(3x^2 + 4)^2}$$

Exercice 10.1. f est la fonction affine par morceaux définie sur $[-4; 4]$ par

$$\begin{cases} f(x) = x + 5 & \text{pour } x \in [-4; -1] \\ f(x) = -x + 3 & \text{pour } x \in [-1; 1] \\ f(x) = 2 & \text{pour } x \in [1; 4] \end{cases}$$

Calculer $\int_{-4}^{-1} f(x)dx$, $\int_{-1}^1 f(x)dx$, $\int_1^4 f(x)dx$. En déduire $\int_{-4}^4 f(x)dx$.

Exercice 10.2. On a représenté la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = -2x^3 + 6x^2 + 8x$. Calculer, en unités d'aires, l'aire de la surface colorée.

Exercice 10.3. On a représenté la courbe d'équation $y = 2 - x^2$ et la droite d'équation $y = -x$. Calculer, en unités d'aires, l'aire de la surface colorée.

Exercice 10.4. Un logiciel de calcul formel affiche :

```
f(x) :=ln(x)
(x)->ln(x)
integrate(f(x),x)
xln(x)-x
integrate(f(x),x,1,100)
100ln(100)-100+1
```

En déduire la valeur moyenne de la fonction $\ln$ entre 1 et 100.

Exercice 10.5. Trouver sur $\mathbb{R}$ une primitive F de la fonction f dans les cas suivants :

$f : x \mapsto x^3 + 3$

$f : x \mapsto x^4 + x^2 - x$

$f : x \mapsto x^3 + 7x^2 - 5x + 1$

$f : x \mapsto ax^2 + bx + c$

$f : x \mapsto x^2 + x + \frac{1}{3x^2}$ sur un intervalle I que l'on précisera.

Exercice 10.6. (supplément) Déterminer sur $\mathbb{R}$ les primitives des fonctions suivantes :

$f(x) = (x + 3)^3$

$g(x) = 2(2x - 1)^2$

$h(x) = (x + 1)(0,5x^2 + x)^4$

$i(x) = 2(x + 2)^4$

$j(x) = 6(3x^2 + 1)(x^3 + x - 4)^5$

Exercice 10.7. (supplément) Trouver une primitive de f sur un intervalle I que l'on précisera.

$f(x) = x(x^2 + 5)^4$

$f(x) = \frac{x + 1}{(x^2 + 2x)^2}$

$f(x) = \left(\frac{1}{x} + x\right)^7 \left(\frac{1}{x^2} - 1\right)$

$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

$f(x) = \frac{1}{(3 - x)^2}$